



Grupo Patología Forense - Dirección Regional Bogotá
Caso No. BOG-2015-020925

Bogotá, D.C. 21-abril-2017
Oficio No. GPF-DRB-D330479-2017

Axctor
JULIAN MARCEL BELTRAN COLORADO
Secretario
Juzgado Civil Del Circuito J- 46
Correo: j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Carrera 10 No. 14 - 30 Piso 7 Edificio Jaramillo Montoya
BOGOTÁ D. C. CUNDINAMARCA

JUZGADO 46 CIVIL CTO.

APR 26 '17 AM 9:45

Medicina
Legal

ASUNTO:

Oficios No. 1093 y 222 de Fecha: 2015-10-29 y 2017-02-24
REF: PROCESO ORDINARIO No. 2012-00561
De: FLOR MARINA SARAY
Contra: SALUDTORAL S.A. - VIRREY SOLIS IPS y CENTRO POLICLINICO DEL
OLAYA CPO S.A
JOSE ALBERTO SIERRA
Caso No. BOG-2015-020925 FECHA 03-diciembre-2015

Respetado doctor Beltrán Colorado:

Por medio de la presente doy respuesta parcial al cuestionario enviado por usted(es) en el oficio No. 1093 del 29 de octubre de 2015, con respecto del caso del señor JOSE ALBERTO SIERRA, proceso ordinario No. 2012-00561. Se hace revisión de historia clínica enviada por usted(es) y se hacen salvedades acerca de puntos que no pueden responderse por parte del personal médico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses:

a. ¿Cuáles son los síntomas de un colangiocarcinoma?

R/ El colangiocarcinoma es el segundo tumor maligno primario más común del hígado, originado en los ductos biliares, sean estos extra o intrahepáticos, encontrándose que es más común en países del sudeste asiático, asociado a inflamación crónica como en enfermedades de los ductos biliares que incluyen la colangitis esclerosante. En estudios recientes se ha asociado también a infecciones por los virus de la hepatitis B y C y otras causas de cirrosis hepática. Sin embargo, en una gran proporción no se identifica un factor de riesgo. La sintomatología principal incluye dolor abdominal e ictericia (coloración amarilla de la piel y mucosas) que se debe principalmente a la obstrucción de la secreción de bilis. Este último síntoma se ha encontrado presente hasta en un 90% de los casos de colangiocarcinoma, especialmente de tipo perihiliar. La detección se hace por pruebas de laboratorio (bilirrubinas, transaminasas), que pueden incluir algunos antígenos tumorales como el denominado CA 19-9 y con exámenes diagnósticos por imagen, como la ecografía, la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética Nuclear (RMN). Otras manifestaciones incluyen prurito (sensación de rasquiña) y pérdida de peso.

b. ¿Esta es una enfermedad de difícil pronóstico?

Nota: Para tramitar cualquier petición con respecto a este oficio, favor citar el número de caso que aparece en la parte superior

4 Congreso Internacional y 19 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
"Formación en la Medicina Legal y Ciencias Forenses"

Del 13 al 17 de agosto de 2018. Cartagena de Indias, Colombia
congreso@medicinalegal.gov.co

"Servicio Forense para una Colombia diversa y en paz"
Dirección: Calle 7 A No. 12 A-51 patología@medicinalegal.gov.co
conmutadores 4069977/44 Ext 1320 1321
www.medicinalegal.gov.co